

temp

Student Group

First Name	Surname	Matrikel Nr.

Table of Contents

Rechnung 2
Rechnung 2
Rechnung 2
Rechnung 2

Rechnung

$$U_A = f(U_E) \text{ mit III.}$$

Rechnung

$U_A = \color{blue}{-U_D} - U_C$	mit II. und I.	$\color{blue}{U_D} = \frac{1}{A_D} \cdot U_A$ $\overset{A_D \rightarrow \infty}{\longrightarrow} 0$
----------------------------------	----------------	--

Rechnung

$U_A = \quad \quad 0 \quad - \color{blue}{U_C}$	mit V.	$\color{blue}{U_C} = \frac{1}{C} \cdot \left(\int_{t_0}^{t_1} I_C \, dt + Q_0(t_0) \right)$
---	--------	--

Rechnung

$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \left(\int_{t_0}^{t_1} \color{blue}{I_C} \, dt + Q_0(t_0) \right)$	mit IV.	$\color{blue}{I_C} = I_R$
$U_A = \color{blue}{-\frac{1}{C} \cdot \left(\int_{t_0}^{t_1} I_R \, dt + Q_0(t_0) \right)}$	Ausklammern	
$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} I_R \, dt - \color{blue}{\frac{Q_0(t_0)}{C}}$	Integrationskonstante betrachten	$\color{blue}{\frac{Q_0(t_0)}{C}} = U_C(t_0) = -U_{A0}$
$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} \color{blue}{I_R} \, dt + U_{A0}$	mit VI. und II.	$\color{blue}{I_R} = \frac{U_R}{R} = \frac{U_E}{R}$
$U_A = -\frac{1}{C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} \color{blue}{\frac{1}{R} \cdot U_E} \, dt + U_{A0}$	Konstante vorziehen	
$U_A = -\frac{1}{R \cdot C} \cdot \int_{t_0}^{t_1} U_E \, dt + U_{A0}$		

From: <https://wiki.mexle.org/> - **MEXLE Wiki**

Permanent link: <https://wiki.mexle.org/temp?rev=1587709619>

Last update: **2021/05/09 09:45**

